

Fresubin® HPC

Dieta hipercalórica, hiperproteica sin fibra, fórmula para alimentación enteral especializada.

Indicaciones:

- Soporte nutricional para pacientes en terapia intensiva, con riesgo de desnutrición y en particular con elevadas necesidades energéticas y proteicas o restricción de líquidos, que requieren una dieta baja en fibra.

Información nutrimental:

Por porción de 200 ml

Kcal/ml	2.0
Contenido energético	400 kcal
Carbohidratos (45 %) *	45.0 g
de los cuales:	
Azúcar	11.6 g
Lactosa	≤ 0.6 g
Proteínas (20 %) *	20.0 g
Grasas (35 %) *	15.6 g
de los cuales:	
Ácidos grasos saturados	1.2 g
Ácidos grasos monoinsaturados	11.6 g
Ácidos grasos poliinsaturados	2.9 g
Fibra (0 %) *	0.0 g
Agua	139 ml
Osmolaridad	590 mOsmol/L
Osmolalidad	850 mOsmol//kg H ₂ O



Vitaminas

Vitamina A	425 µg RE
De la cual β- Caroteno	125 µg RE
Vitamina D ₃	10.0 mg
Vitamina E	7.50 mg α-TE
Vitamina K ₁	42.0 µg
Vitamina B ₁	0.6 mg
Vitamina B ₂	0.8 mg
Niacina	11.16 mg NE
Vitamina B ₆	0.85 mg
Vitamina B ₁₂	1.50 µg
Ácido pantoténico	3.0 mg
Biotina	18.8 µg
Ácido Fólico	125 µg
Vitamina C	37.5 mg

Minerales

Sodio	120 mg / 5.2 mmol
Potasio	320 mg / 8.2 mmol
Cloruro	160 mg / 4.5 mmol
Calcio	410 mg / 10.3 mmol
Magnesio	32 mg / 1.3 mmol
Fósforo	240 mg / 7.8 mmol
Hierro	5.0 mg
Zinc	3.2 mg
Cobre	750 µg
Manganeso	1.0 mg
Yodo	75.0 µg
Fluoruro	0.50 mg
Cromo	25.0 µg
Molibdeno	37.5 µg
Selenio	27.0 µg

*Distribución energética

RE = Retinol



**FRESENIUS
KABI**

Ingredientes:

Agua, vitaminas trituradas, β -caroteno, L-ácido ascórbico, vitamina A, maltodextrina, jarabe de glucosa, sacarosa, caseinato de calcio, proteínas de leche, citrato tripotásico, óxido de magnesio, cloruro de sodio, carbonato de potasio, carbonato de sodio, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de cobre, cloruro de manganeso, yoduro de potasio, fluoruro de sodio, cloruro de cromo, molibdato de sodio, selenito de sodio, aceite de girasol, aceite de canola, lecitina de soya, monoglicéridos, sabor frutas del bosque, polvo de betabel, extracto de especies rojas, ácido clorhídrico.

Dosis:

La indicada por el médico o nutriólogo.

Vía de administración:

Oral y/o por sonda.

Instrucciones de preparación:

Agítese suavemente antes de abrir. El producto está listo para tomarse frío o a temperatura ambiente.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionando ni accesible y/o se requiera mantenerlo en reposo. Este producto no es adecuado para lactantes menores de un año. Pacientes con sangrado del tubo digestivo, íleo y shock. Utilizar con precaución en caso de insuficiencia orgánica grave con metabolismo y formas graves de malabsorción. No es adecuado para pacientes con incapacidad congénita de metabolizar nutrientes contenidos en el producto como la galactosemia.

Recomendaciones sobre almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente.

Leyendas de precaución:

No se deje al alcance de los niños No se recomienda su uso en niños menores de 1 año de edad. No para uso Parenteral. Consulte a su médico o nutriólogo para la recomendación de uso No es adecuado como única fuente de nutrición. Monitorear un aporte adecuado de líquidos, es mandatorio. No se recomienda en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula, cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionando ni accesible y/o se requiera mantenerlo en reposo. Contiene derivados de leche y soya. Consumase antes de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Presentación:

Envase con 200 ml en sabor frutos del bosque.

Registro Sanitario No. 011F2018.

09/Nov/2020

No de entrada a CIS 203300 202C4828