

## Diben-HPC

Dieta Polimérica hipercalórica, baja en carbohidratos con fibra, EPA y DHA. Fórmula para alimentación enteral especializada.

### Indicaciones:

- Apoyo nutricional para pacientes con o en riesgo de desnutrición relacionada con una enfermedad, en particular con intolerancia a la glucosa, como en:
  - Resistencia a la insulina debido a enfermedades agudas o crónicas.
  - Diabetes mellitus.

### Información nutricional:

Por porción de 200 ml

<b>Kcal (KJ)/ml</b>	<b>1.5 (6.3)</b>
<b>Contenido energético</b>	<b>300 kcal (1260 KJ)</b>
<b>Carbohidratos (35 %) *</b>	<b>26.2 g</b>
de los cuales Oligo y polisacáridos	10.70 g
de los cuales almidón:	10.50 g
de los cuales azúcares	5.0 g
de la cual Fructosa	3.8 g
de la cual Lactosa	≤1.0 g
<b>Fibra (3 %) *</b>	<b>4.0 g</b>
<b>Proteínas (20 %) *</b>	<b>15.0 g</b>
<b>Grasas (42 %) *</b>	<b>14.0 g</b>
de los cuales ácidos grasos saturados:	3.4 g
de los cuales MCT	2.4 g
de los cuales ácidos grasos monoinsaturados	7.6 g
de los cuales ácidos grasos poliinsaturados	3.0 g
de los cuales EPA y DHA	0.108 g
de los cuales Colesterol	≤12 mg
Sal	0.36 g
Agua	158 mL
Osmolaridad	390 mOsm/L
Osmolalidad	490 mOsm/kg H <sub>2</sub> O

\*Distribución energética





**FRESENIUS  
KABI**

### Vitaminas

Vitamina A	340.0 µg RE
De la cual β- Caroteno	100.0 µg RE
Vitamina D <sub>3</sub>	4.0 µg
Vitamina E	6.0 mg α-TE
Vitamina K <sub>1</sub>	33.4 µg
Vitamina B <sub>1</sub>	0.46 mg
Vitamina B <sub>2</sub>	0.64 mg
Niacina	3.00 mg (5.52 mg NE)
Vitamina B <sub>6</sub>	0.66 mg
Vitamina B <sub>12</sub>	1.2 µg
Ácido pantoténico	2.4 mg
Biotina	15.0 µg
Ácido Fólico	100 µg
Vitamina C	30.0 mg
Colina	53.4 mg
Cafeína	1.0 mg

### Minerales

Sodio	140 mg / 6.2 mmol
Potasio	260 mg / 6.6 mmol
Cloruro	110 mg / 3.2 mmol
Calcio	300 mg / 7.4 mmol
Magnesio	30 mg / 1.2 mmol
Fósforo	190 mg / 6,2 mmol
Hierro	4.0 mg
Zinc	3.0 mg
Cobre	600 µg
Manganeso	0.8 mg
Yodo	60 µg
Fluoruro	0.4 mg
Cromo	20.0 µg
Molibdeno	30.0 µg
Selenio	20.0 µg

RE = equivalentes de Retinol NE = equivalentes de Niacina α-TE= equivalentes de alfa tocoferol

### Ingredientes:

Agua, proteína de leche, almidón modificado, aceites vegetales (aceite de canola, aceite de girasol), maltodextrina, fructosa, triglicéridos de cadena media (MCT), saborizantes, citrato de potasio, aceite de pescado, emulsionantes (E 471, lecitinas de soya), cloruro de sodio, tartrato de hidrógeno de colina, regulador de acidez (E 524), vitamina C, edulcorantes (ciclato de sodio, sacarina de sodio), óxido de magnesio, pirofosfato de hierro, sulfato de zinc, vitamina E, niacina, ácido pantoténico, cloruro de manganeso, sulfato de cobre, vitamina B<sub>2</sub>, vitamina B<sub>1</sub>, vitamina B<sub>6</sub>, fluoruro de sodio, β-caroteno, vitamina A, ácido fólico, cloruro de cromo, yoduro de potasio, molibdato de sodio, selenito de sodio, vitamina K<sub>1</sub>, biotina, vitamina D<sub>3</sub>, vitamina B<sub>12</sub>, cafeína\*\*.

\*\* solo en sabor capuchino.

Libre de gluten, lactosa y purina, bajo en colesterol y sodio.

### Dosis:

La indicada por el médico o nutriólogo. Puede usarse para nutrición enteral completa o complementaria. Diben es nutricionalmente completo en proteínas, ácidos grasos esenciales, fibra dietética, vitaminas, minerales y oligoelementos.

### Vía de administración:

Oral y/o por sonda.

### Instrucciones de preparación:

Agítese suavemente antes de abrir. El producto está listo para tomarse frío o a temperatura ambiente.

### Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula, cuando el tracto gastrointestinal no esté funcionando ni accesible y/o se requiera mantenerlo en reposo. No es adecuado para niños menores de 3 años, pacientes con sangrado del tubo digestivo, íleo y shock. Utilizar con precaución en caso de fallo severo en órganos. No es adecuado para pacientes con incapacidad congénita de metabolizar nutrimentos contenidos en el producto, como la galactosemia.

### Recomendaciones sobre almacenamiento:

Almacenar a temperatura ambiente. Una vez abierto el envase debe conservarse en refrigeración y consumirse dentro de las 24 horas siguientes.

### Leyendas de precaución:

No se deje al alcance de los niños. No para uso Parenteral. No se use en niños menores de 3 años, usar con precaución en niños de 3 a 6 años. Debe consumirse por indicación del médico o nutriólogo. Monitorear un aporte adecuado de líquidos, es mandatorio. No se recomienda en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula. No es adecuado como única fuente de nutrición. Contiene derivados de leche. Consumase antes de la fecha de caducidad indicada en el envase. El sabor capuchino contiene cafeína.

Para mayor información del producto comuníquese al teléfono: 33-35-40-78-00. Del resto de la República 800-112 2212.

### Presentación:

Frasco de plástico con 200 mL. Sabor capuchino.

Rejilla de cartón con 4 frascos con 200 mL. Sabor capuchino.

Registro Sanitario No. 023F2021 SSA